

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-11-70 119129

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

~~Calvados~~, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, ~~MANCHE~~, MORBIHAN, ~~ORNE~~

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

ANNEXE AU BULLETIN N° 122

10 NOVEMBRE 1970

TRAITEMENTS A LA CHUTE DES FEUILLES DES ARBRES FRUITIERS

Ils ont pour but de lutter contre diverses maladies : Chancre commun des arbres fruitiers à pépins, Maladie bactérienne du poirier (*Pseudomonas syringae*), Cloque du pêcher, Coryneum des arbres fruitiers à noyau.

Des contaminations sont en effet à craindre à cette époque du fait de la quantité encore importante de germes libérés et des nombreuses portes d'entrée que constituent les petites plaies produites sur l'arbre au point d'attache de chaque feuille venant de tomber.

Dans les vergers assez fortement infectés, deux traitements fongicides sont recommandés, l'un au début, l'autre aux deux tiers de la chute des feuilles.

Dans les plantations faiblement contaminées, une seule application effectuée en pleine période de chute des feuilles suffit.

La pulvérisation doit être copieuse et réalisée chaque fois que possible après suppression des rameaux chancreux.

Employer un produit cuprique (500 g minimum de cuivre métal/hl) ou une spécialité à base d'oxyquinoléate de cuivre (60 g de M.A./hl).

DESSECHEMENT DES RAMEAUX DE FRAMBOISIERS

Après élimination des rameaux les plus atteints, effectuer un traitement cuprique (200 à 300 g de cuivre métal/hl) lors de la chute des feuilles.

BRULURE DES FEUILLES D'OIGNON

Sur les plantes issues d'un semis de fin d'été ou de début d'automne, la "brûlure" des feuilles, provoquée par *Botrytis squamosa*, peut être combattue par des traitements préventifs. Nous arrivons dans la période où ceux-ci sont particulièrement nécessaires. La cadence moyenne d'une application

P. 336

par semaine est convenable. Cependant, il est souvent utile d'accentuer la cadence des traitements par temps humide et frais et de la réduire en période sèche.

Employer de préférence le Propinèbe (Antracol), ou à défaut le Mancozèbe ou le Manèbe, à raison de 20 g de matière active à l'are.

Ces traitements ne sont efficaces que s'ils sont effectués en pulvérisation pneumatique (atomiseur).

L'Ingénieur chargé des
Avertissements agricoles,

G. PAITIER

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.

LISTE DES PRIX ATTRIBUES EN 1970, A L'OCCASION DU CONCOURS
CONCERNANT LA DETECTION DES PREMIERES TACHES
DU MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

COTES-DU-NORD

- M. BERNARD Emile, CALLAC 50 Fr
- M. KERFORN Jean, PLOUISY 30 Fr

FINISTERE

- M. PERROT Joseph, LESNEVEN 50 Fr
- M. BEYOU Maurice, SAINT-RENAN 30 Fr

MORBIHAN

- M. CARRE Félix, PONTIVY 50 Fr
 - M. LE DORZE Albert, PONTIVY 30 Fr
-